Guide de référence rapide 2025 pour les raisins

Regroupement	Produit (Groupe)	Homologation n°	Culture	Mode d'application	Type de préparation	Ordre de mélange WALES	Nbre maximal d'applications*	Dose d'application*	Adjuvant	Intervalle (jours)	DS (heures)	DAAR (jours)	Suppression de	Commentaires
Bio-solution														
Biostimulant	MEGAFOL	2016013D	Toutes	Foliaire	L	S	S.O.	1,0 L/acre (2,5 L/ha)	Aucun	10 à 15	0	0		Aide les plantes à répondre aux stress abiotiques imprévus, notamment les dommages physiques, la chaleur, les basses températures et la sècheresse. En cas de dommage physique, appliquer dès que possible par la suite.
Fongicides														
Maladie de début de saison	Allegro (Groupe 29)	27517	Raisins destinés à la production de vin	Foliaire	SC	L	2	0,4 à 0,48 L/ac (1 à 1,2 L/ha)	Aucun	7 à 14	9 jours pour palissage/conduite et arrachage des feuilles à la main. 2 jours pour l'irrigation manuelle. 12 heures pour toutes les autres activités.	21	Moisissure grise, nécrose, anthracnose (répression)	La dose d'application diffère selon la cible.
	Aprovia (Groupe 7)	31981	Raisins	Foliaire	EC	E	3	0,20 à 0,30 L/acre (500 à 750 mL/ha)	Aucun	11 à 21	4 jours pour effectuer l'annélation et le retournement des sarments; 12 heures pour toutes les autres activités.	21	Oïdium (blanc)	Pour une meilleure gestion de la résistance, utiliser seulement avant la floraison. Ne pas effectuer plus de 3 applications d'un fongicide du Groupe 7 par saison.
	Aprovia Top (Groupes 3 + 7)	31526	Raisins	Foliaire	EC	E	4	0,26 L/acre (0,64 L/ha)	Aucun	11 à 21	10 jours pour effectuer l'annélation et le retournement des sarments; 12 heures pour le dépistage, 2 jours pour toutes les autres activités	21	Oïdium (blanc)	Pour une meilleure gestion de la résistance, utiliser seulement avant la floraison. Ne pas effectuer plus de 3 applications d'un fongicide du Groupe 7 par saison.
Oïdium (blanc) et pourriture grise	InspireSuper (Groupe 3 + 9)	30827	Raisins	Foliaire	EW	E	2	0,34 à 0,6 L/acre (0,84 à 1,48 L/ha)	Agent tensioactif non ionique 0,1 % v/v	15 à 21	15 jours pour effectuer l'annélation et le retournement des sarments; 7 jours pour toutes les autres activités	14	Anthracnose foliaire, alternariose, oïdium (blanc), pourriture grise, pourriture noire	Pour la gestion de la résistance de *Botrytis cinerea*, limiter les applications de fongicides du Groupe 9 à une seule lorsqu'il y a moins de quatre applications.
	Miravis Prime (Groupe 7 + 12)	33207	Raisins	Foliaire	SC	L	2	0,32 à 0,4 L/acre (0,8 à 1,0 L/ha)	Aucun	21	1 jour pour effectuer l'annélation et le retournement des sarments; 12 heures pour toutes les autres activités	14	Moisissure grise, oïdium (blanc)	Suppression de l'oïdium (blanc) lorsqu'il est appliqué au moment idéal pour la moisissure grise. Ne pas appliquer plus de 552 g de fludioxonil par hectare par saison.
Pourriture grise	Allegro (Groupe 29)	27517	Raisins destinés à la production de vin	Foliaire	SC	L	2	400 mL/ac (1,0 L/ha)	Aucun	21	9 jours pour palissage/conduite et arrachage des feuilles à la main. 2 jours pour l'irrigation manuelle. 12 heures pour toutes les autres activités.		Pourriture grise	La couverture complète des grappes est essentielle.
	Switch 62.5WG (Groupes 9 + 12)	28189	Raisins	Foliaire	WG	W	2	314 à 395 g/acre (775 à 975 g/ha)	Aucun	21	7 jours pour effectuer l'annélation et le retournement des sarments; 2 jours pour le tuteurage, l'éclaircissement des raisins, l'élagage à la main, le palissage et l'effeuillage à la main; 12 heures pour toutes les autres activités	7	Pourriture grise	Pour la gestion de la résistance de *Botrytis cinerea,* limiter les applications de fongicides du Groupe 9 à une seule lorsqu'il y a moins de quatre applications.
Mildiou	Revus (Groupe 40)	29074	Raisins	Foliaire	SC	L	4	0,2 L/acre (0,5 L/ha)	Agent tensioactif non ionique 0,25 % v/v	7 à 10	12	14	Mildiou	Aux fins de la gestion de la résistance, les fongicides du Groupe 40 devraient être appliqués en mélange avec un produit d'association en réservoir qui procure également une suppression du mildiou.

DS = Délai de sécurité DAAR = Délai d'attente avant la récolte S.O. = Sans objet

* Pour des renseignements complets à propos des doses, consulter l'étiquette du produit. Les informations sur les doses sont basées sur les étiquettes des produits. Si l'étiquette d'un produit contient des fourchettes de doses, alors le présent guide de référence rapide énumérera soit : (i) la fourchette de doses complète; (ii) la fourchette de doses la plus courante; ou (iii) la dose la plus couramment utilisée. Avant l'application, toujours consulter l'étiquette afin de confirmer les renseignements sur l'homologation pour la culture/le groupe de cultures et sur l'application, ainsi que sur les zones tampons, l'EPI, etc.

Tous les renseignements sont à jour au moment de la publication et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pour plus d'information, communiquez avec notre Centre d'interaction avec la clientèle au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682) ou visitez Syngenta.ca.

Toujours lire l'étiquette et s'y conformer. Agri-Mek®, Allegro®, Aprovia®, Inspire Super®, Miravis®, Revus®, Switch®, Venture® et le logotype Syngenta sont des marques de commerce d'une société du groupe Syngenta. Megafol® est une marque déposée de VALAGRO S.p.A., société du groupe Syngenta.
© 2024 Syngenta.

240918

Tirez fierté de vos produits

Accédez à des informations sur la protection des cultures afin de produire les récoltes les plus commercialisables.

syngenta®

Tirez fierté de vos produits

Accédez à des informations sur la protection des cultures afin de produire les récoltes les plus commercialisables.

Guide de référence rapide 2025 pour les raisins

Regroupement	Produit (Groupe)	Homologation n°	Culture	Mode d'application	Type de préparation	Ordre de mélange WALES	Nbre maximal d'applications*	Dose d'application*	Adjuvant	Intervalle (jours)	DS (heures)	DAAR (jours)	Suppression de	Commentaires
Insecticide														
Acariens	Agri-Mek SC (Groupe 6)	31607	Raisins	Foliaire	SC	L	2	53 à 107 mL/acre (130 à 265 mL/ha)	Agent tensioactif non ionique 0,1 à 0,5 % v/v	21	21 jours pour effectuer l'annélation et le retournement des sarments; 13 jours pour le tuteurage, l'éclaircissement des raisins, l'élagage à la main, le palissage et l'effeuillage à la main; 12 heures pour toutes les autres activités	28	Tétranyque à deux points, tétranyque rouge du pommier	
Herbicide														
Graminées	Venture L (Groupe 1)	21209	Raisins	Foliaire	EC	E	1	0,24 à 0,81 L/acre (0,6 à 2 L/ha)	Aucun	S.O.	12	30	Mauvaises herbes graminées annuelles et vivaces	La dose d'application diffère selon la cible.

Moment approprié pour l'application

Débourrement	Développement des feuilles	Floraison	Postfloraison/Début de la formation des fruits	Les fruits se touchent/ Fermeture de la grappe	Véraison	Récolte
Aprovia / Aprovia Top						
		Switch				
		Miravis Prime				