Guide de référence rapide 2025 pour les cucurbitacées

Regroupement	Produit (Groupe)	Homologation n°	Culture (Groupe de cultures)	Mode d'application	Type de préparation	Ordre de mélange WALES	Nbre maximal d'applications*	Dose d'application*	Adjuvant	Intervalle (jours)	DS (heures)	DAAR (jours)	Suppression de	Répression de	Commentaires
Bio-solutions															
Biostimulant	MEGAFOL	2016013D	Cucurbitacées (9)	Foliaire	L	S	S.O.	1,0 L/acre (2,5 L/ha)	Aucun	10 à 15	0	0			Aide à réduire les stress abiotiques, notamment les dommages physiques, la chaleur, les basses températures et la sècheresse. En cas de dommage physique, appliquer dès que possible par la suite.
Biofertilisation	AMATIS™	2017126F	Toutes	Bassinage ou traitement du sol	L	S	S.O.	1,4 L/acre (3,5 L/ha)	Aucun	14 à 21	0	0			Amatis™aide à revitaliser et à améliorer la rhizosphère autour des racines, ce qui favorise leur croissance et permet d'améliorer le rendement et l'uniformité.
Fongicide															
Pourritures des racines	Orondis® Gold Orondis® Gold DC (Groupes 4 + 49)	33508 35176	Concombres	En bandes et au goutte-à-goutte	EC	E	1	0,81 L/acre (2,0 L/ha)	S.O.	S.O.	12	S.O.	Fonte des semis causée par Pythium, pourriture phytophthoréenne des racines et du collet		
Pourritures des racines	Revus® (Groupe 40)	29074	Cucurbitacées (9)	Goutte-à-goutte	SC	L	4	0,24 L/acre (0,6 L/ha)	S.O.	7 à 10	12	0		Pourriture phytophthoréenne des racines et du collet	
Pourritures des racines	RidomilGold® 480 SL (Groupe 4)	28474	Concombres	En bandes	SL	S	1	2,25 à 4 mL/ 100 m de rang	S.O.	S.O.	12	S.O.	Fonte des semis causée par Pythium		
Taches foliaires, oïdium (blanc) et pourritures des fruits	Miravis® Duo (Groupe 3 + 7)	33206	Cucurbitacées (9)	Foliaire	SC	L	2	0,4 L/acre (1,0 L/ha)	Aucun	14	12	0	Oïdium (blanc), tache alternarienne, anthracnose, chancre gommeux	Brûlure alternarienne	
Taches foliaires, oïdium (blanc) et pourritures des fruits	Aprovia® (Groupe 7)	31981	Cucurbitacées (9)	Foliaire	EC	L	4	202 à 303 mL/acre (500 à 750 mL/ha)	Aucun	7	12	1	Oïdium (blanc), alternariose, anthracnose, cercosporose, chancre gommeux		La dose d'application diffère selon la cible.
Taches foliaires, oïdium (blanc) et pourritures des fruits	Quadris Top® (Groupes 3 + 11)	30518	Cucurbitacées (9)	Foliaire	SC	L	4	0,29 à 0,4 L/acre (0,71 à 1,0 L/ha)	Aucun	7 à 14	12	1	Oïdium (blanc), brûlure alternarienne (hâtive), anthracnose, pourriture noire		
Taches foliaires, oïdium (blanc) et pourritures des fruits	Revus® (Groupe 40)	29074	Cucurbitacées (9)	Foliaire	SC	L	4	0,16 à 0,24 L/acre (0,4 à 0,6 L/ha)	Aucun	7 à 10	12	0		Brûlure phytophthoréenne, mildiou	La dose d'application diffère selon la cible. Doit être mélangé en réservoir avec Bravo® ZN lorsqu'on cible le mildiou. Les performances pourraient être perturbées s'il y a présence de résistance.
Mildiou	Orondis® Ultra (Groupes 40 + 49)	32805	Cucurbitacées (9)	Foliaire	SC	L	4	0,16 à 0,24 L/acre (0,4 à 0,6 L/ha)	Aucun	7 à 10	12	0	Mildiou	Brûlure phytophthoréenne	Mélanger en réservoir avec un produit ayant un autre mode d'action mais une activité contre l'oïdium.
Large spectre	Allegro® (Groupe 29)	27517	Cucurbitacées (9)	Foliaire	SC	L	3	0,35 à 0,71 L/acre (0,875 à 1,75 L/ha)	Aucun	7	24	30	Petite dose: alternariose Grosse dose: Mildiou, pourriture noire	Petite dose: Mildiou, pourriture noire	La dose d'application dépend de la cible.
Large spectre	Bravo ZN Bravo ZNC (Groupe M)	28900 33515	Cucurbitacées (9)	Foliaire	SC	L	2	1,94 L/acre (4,8 L/ha)	Aucun	7	12	2	Anthracnose, oïdium (blanc), gale, mildiou		Les ravageurs ciblés diffèrent selon les cultures.
Insecticide															
Large spectre	Minecto® Pro (Groupes 6 + 28)	33023	Cucurbitacées (9)	Foliaire	SC	L	Dose faible : 5 Dose élevée : 3	0,15 à 0,27 L/acre (0,37 à 0,67 L/ha)	Agent tensioactif non ionique 0,1 à 0,5 % v/v	7	12	7	Fausse-arpenteuse du chou, légionnaire, légionnaire d'automne, ver-gris, tétranyques, ver de l'épi du maïs		La dose d'application diffère selon la cible. Le nombre maximal d'applications dépend de la dose d'application. Ne pas appliquer Minecto® Pro dans les 60 jours suivant une application au sol d'un insecticide du Groupe 28.

* Pour des renseignements complets à propos des doses, consulter l'étiquette du produit. Les informations sur les doses sont basées sur les étiquettes des produits.
Si l'étiquette d'un produit contient des fourchettes de doses, alors le présent guide de référence rapide énumérera soit : (i) la fourchette de doses complète; (ii) la fourchette de doses la plus courante;
ou (iii) la dose la plus couramment utilisée. Avant l'application, toujours consulter l'étiquette afin de confirmer les renseignements sur l'homologation pour la culture/le groupe de cultures et sur l'application, ainsi que sur les zones tampons, l'EPI, etc.

DS = Délai de sécurité DAAR = Délai d'attente avant la récolte S.O. = Sans objet

Orondis®

Passez à la vitesse supérieure avec Orondis

Orondis® Gold Orondis® Ultra
Orondis® Gold DC

syngenta®

Tirez fierté de vos produits

Accédez à des informations sur la protection des cultures afin de produire les récoltes les plus commercialisables.

Guide de référence rapide 2025 pour les cucurbitacées

Regroupement	Produit (Groupe)	Homologation n°	Culture (Groupe de cultures)	Mode d'application	Type de préparation	Ordre de mélange WALES	Nbre maximal d'applications*	Dose d'application*	Adjuvant	Intervalle (jours)	DS (heures)	DAAR (jours)	Suppression de	Répression de	Commentaires
Herbicides															
Feuilles larges	Reflex® (Groupe 14)	24779	Concombres	En bandes	EC	E	1	0,4 L/acre (1,0 L/ha)	Agent tensioactif non ionique 0,1 % v/v Turbocharge® 0,25 % v/v	S.O.	12	42	Amarante à racine rouge, petite herbe à poux		Est du Canada et Colombie-Britannique seulement. Voir l'étiquette pour les instructions d'application.
Feuilles larges et graminées	DualIIMagnum® (Groupe 15)	25729	Cucurbitacées (9) , à l'exception des concombres	Prélevée	EC	E	1	En bandes : 0,47 à 0,63 L/acre (1,15 à 1,56 L/ha) Application généralisée : 0,47 L/acre (1,15 L/ha)	Aucun	S.O.	12	30	Morelle, graminées annuelles	Amarante à racine rouge	Voir l'étiquette pour les instructions d'application.
Graminées	Venture L (Groupe 1)	21209	Concombres	Postlevée	EC	E	1	0,32 à 0,81 L/acre (0,8 à 2,0 L/ha)	Aucun	S.O.	12	30	Graminées annuelles		La dose d'application diffère selon la cible.

Moment approprié pour l'application

Concombres

Repiquage/semis	Retombée des pousses	Floraison	Mise à fruits	Développement des fruits	Récolte
	Bravo ZN, Bravo ZNC				
	Allegro				
	Orondis Ultra				
	Quadris Top				
	Aprovia				
	Miravis Duo				
	AMATIS				
	MEGAFOL				
Reflex					
	Venture L				

Courges

Repiquage/semis	Croissance végétative	Floraison	Mise à fruits	Développement des fruits	Récolte
	Bravo ZN, Bravo ZNC				
	Quadris Top				
	Aprovia				
	Miravis Duo				
	Allegro				
	Orondis Ultra				
	AMATIS				
	MEGAFOL				
DualIIMagnum					

Tous les renseignements sont à jour au moment de la publication et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pour plus d'information, communiquez avec notre Centre d'interaction avec la clientèle au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682) ou visitez Syngenta.ca.

Toujours lire l'étiquette et s'y conformer. Aprovia®, Bravo®, Dual II Magnum®, Minecto®, Miravis®, Orondis®, Quadris Top®, Reflex®, Revus®, Ridomil Gold®, Turbocharge®, Venture® et le logotype Syngenta sont des marques de commerce d'une société du groupe Syngenta. Allegro® est une marque de commerce d'ISK Biosciences Corporation. Amatis™ et Megafol® sont des marques déposées de VALAGRO S.p.A., société du groupe Syngenta. © 2024 Syngenta

240918