

Guide de référence rapide 2025 pour la pomme de terre



Regroupement	Produit (Groupe)	Homologation n°	Mode d'applica- tion	Ordre de mélange WALES	Nbre maximal d'applications*	Dose d'application*	DS	Suppression de	Répression de	Commentaires
Bio-solutions										
Biostimulants	 MECAFOL	2016013D	Foliaire	S	S.O.	1,0 L/acre (2,5 L/ha)	0			Aide les plantes à répondre aux stress abiotiques imprévus, notamment les dommages physiques, la chaleur, les basses températures et la sécheresse. Considérer comme une partie régulière de votre programme de pulvérisation pour aider dans les situations de stress. En cas de dommage physique, appliquer dès que possible par la suite.
Biofertilisation	 Envita	2020065A	Foliaire	L	S.O.	5 g/acre (12,5 g/ha)	0			Il est préférable d'appliquer Envita en solo, avec un agent tensioactif non ionique. Des produits d'association en réservoir additionnels pourraient avoir un effet néfaste sur <i>Gluconacetobacter diazotrophicus</i> , la matière active d'Envita. Voir la page produit d'Envita pour des recommandations sur l'utilisation et les meilleures pratiques de gestion partagées par Azotic Technologies, le fabricant d'Envita. Syngenta.ca/fr/productsdetail/envita#tank-mix . Entreposer Envita dans un endroit frais et sec.
Traitements de semences										
Maladie transmise par la semence	 Revus (Groupe 40)	29074	Sur la semence	L	1	13 à 26 mL/100 kg (5,9 à 11,8 mL/cwt)	S.O.	Mildiou transmis par les plantons (en prévention)	Pourriture rose	
	 Vibrance[®]Ultra (Groupes 3 + 7 + 40)	33171	Sur la semence	L	1	32 mL/100 kg + 2,0 mL/100 kg de colo- rant bleu (inclus dans le second comparti- ment du bidon)	S.O.	Rhizoctonie, pourriture sèche fusarienne, gale argentée, mildiou (en prévention)	Pourriture rose	
Ravageurs broyeurs et suceurs	 Actara[®]240SC (Groupe 4)	28407	Sur la semence	L	1	7,9 à 24,4 mL/100 kg (3,6 à 11,1 mL/cwt)	S.O.	Pucerons, doryphore de la pomme de terre, cicadelle de la pomme de terre		La dose d'application dépend du taux de semis. Ne pas dépasser 488 mL/ha/saison.
Large spectre	 CruiserMaxx[®] Vibrance (Groupe 4 + 3 + 7 + 12)	32009	Sur la semence	L	1	32,5 mL/100 kg de semences (14,7 mL/cwt)	S.O.	Rhizoctonie, pourriture sèche fusarienne, gale argentée, pucerons, cicadelle de la pomme de terre		Facultatif + 2,0 mL de colorant bleu (petit bidon)/100 kg de semences.
Dans le sillon										
Maladie transmise par le sol	 Elatus (Groupes 7 + 11)	31973 31977	Dans le sillon	L E	1	Elatus [®] A : 4 à 6 mL/100 m de rang Elatus [®] B : 0,2 à 0,3 L/acre (0,5 à 0,75 L/ha)	12 heures	Rhizoctone de la tige et des stolons, gale argentée	Verticilliose	Afin d'optimiser la gestion de la résistance, compter les applications sur les plantons et au sillon de fongicides du Groupe 7 dans le total des applications foliaires recommandées du Groupe 7
	 Quadris (Groupe 11)	26153	Dans le sillon	L	1	4 à 6 mL/100 m de rang	12 heures	Rhizoctonie, gale argentée		
	 RidomilGold[®] (Groupe 4)	28474	Dans le sillon	S	1	4 mL/100 m de rang	12 heures		Pourriture rose	
	 Orondis[®]Gold (Groupe 4 + 49)	33284 32937	Dans le sillon	L S	1	Orondis A : 3,2 mL/100 m de rang Orondis B : 4,0 mL/100 m de rang	12 heures		Pourriture rose, pourriture aqueuse	
	 Orondis[®]Gold DC (Groupe 4 + 49)	35176	Dans le sillon	E	1	18 mL/100m rang	12 heures		Pourriture rose, pourriture aqueuse	
Ravageurs broyeurs et suceurs	 Actara[®]240SC (Groupe 4)	28407	Dans le sillon	L	1	3,4 à 4,4 mL/100 m de rang	12 heures	Pucerons, doryphore de la pomme de terre, cicadelle de la pomme de terre		

DS = Délai de sécurité DAAR = Délai d'attente avant la récolte S.O. = Sans objet



Moment d'application



Traitement de semences	Semis	Croissance végétative	Tubérisation	Pleine floraison	Remplissage des tubercules	Défanage	Postrécolte
 Vibrance [®] Ultra [®] Potée			 Ridomil Gold [®] MEGA			 Reglone [®]	 Stadium [®]
 CruisenMaxx Vibrance [®] MEGA	 Quadris [®]	 BravoZN					
	 Elatius [®]	 Quadris Top					
			 Aprovia Top				
	 Orondis Gold [®] Potée			 Miravis Duo			
			 Revus [®]				
				 Orondis Ultra			
					 Allegro		
		 MEGAFOL					
		 Envita [®]					
					 Minecto Pro		
	 Boundary [®] LQD						
	 DualII Magnum [®]						
	 X Reflex [®]						
			 Venture L				

Les meilleurs partenaires ne se contentent pas de parler. Ils approfondissent le sujet.

Pour en savoir plus, consultez [Syngenta.ca/agronomie-pommedeterre](https://syngenta.ca/agronomie-pommedeterre)

Veillez vérifier auprès de votre emballer ou de votre exportateur avant d'utiliser Allegro®, Bravo® ZNC/ZN, Dual® II Magnum, Miravis® Neo, Miravis® Prime, Orondis® Gold, Quilt®, Ridomil® Gold et Venture® L sur des baies destinées à être utilisées à l'extérieur du Canada. Au moment de l'impression, des limites maximales de résidus (LMR) avaient été établies pour les matières actives fluazifop-p-butyl, oxathiapiproline et S-métolachlore pour les marchés d'exportation des États-Unis, ainsi que pour les matières actives azoxystrobine, chlorothalonil, fluaziname, métalaxyl-M, pydiflumétofène et propiconazole pour les marchés d'exportation des États-Unis et du Japon. Pour une liste complète des LMR, veuillez consulter la base de données Foodchain ID Regulatory Limits by BCGlobal à l'adresse <https://bcglobal.bryantchristie.com/db#/pesticides/query>. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires sur les LMR pour les marchés d'exportation, veuillez consulter Syngenta pour obtenir les informations les plus récentes.

* Pour des renseignements complets à propos des doses, consulter l'étiquette du produit. Les informations sur les doses sont basées sur les étiquettes des produits.Si l'étiquette d'un produit contient des fourchettes de doses, alors le présent guide de référence rapide énumérera soit : (i) la fourchette de doses complète; (ii) la fourchette de doses la plus courante; ou (iii) la dose la plus couramment utilisée. Avant l'application, toujours consulter l'étiquette afin de confirmer les renseignements sur l'homologation pour la culture/le groupe de cultures et sur l'application, ainsi que sur les zones tampons, l'EPI, etc.

Tous les renseignements sont à jour au moment de la publication et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pour plus d'information, communiquez avec notre Centre d'interaction avec la clientèle au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682) ou visitez [Syngenta.ca](https://syngenta.ca).

Toujours lire l'étiquette et s'y conformer. Elatus® est un emballage jumelé du fongicide Elatus® A et du fongicide Elatus® B. Orondis Gold Potato est une application dans le sillon des fongicides Orondis Gold Potato A 200SC et Orondis Gold Potato B 480SL. Actara®, Agri-Mek®, Aprovia®, Boundary®, Bravo®, Cruiser Maxx®, Dual II Magnum®, Elatus®, Fufill®, Mertect®, Minecto®, Miravis®, Orondis®, Quadris®, Quadris Top®, Reflex®, Reglone®, Revus®, Ridomil Gold®, Stadium®, Venture®, Vifrance® et le logotype Syngenta sont des marques de commerce d'une société du groupe Syngenta.. Allegro® est une marque de commerce d'ISK Biosciences Corporation. Megafol® est une marque déposée de VALAGRO S.p.A., société du groupe Syngenta. Envita® est une marque de commerce d'Azotic Technologies limitée utilisée sous licence. © 2024 Syngenta 240918

Guide de référence rapide 2025 pour la pomme de terre

Regroupement	Produit (Groupe)	Homologation n°	Mode d'applica-tion	Ordre de mélange WALES	Nbre maximal d'applications*	Dose d'application*	Adjuvant	Intervalle (jours)	DS	DAAR (jours)	Suppression de	Répression de	Commentaires
	Fongicides												
Taches foliaires	 Aprovia® Top (Groupe 3 + 7)	31526	Foliaire	E	4 (2)	0,26 à 0,39 L/acre (0,64 à 0,97 L/ha)	Aucun	7 à 14	12 heures	14	Brûlure hâtive	Taches brunes	Afin d'optimiser la gestion de la résistance, compter les applications sur les plantons et dans le sol de fongicides du Groupe 7 dans le total des applica-tions foliaires recommandées du Groupe 7.
	 Miravis® Duo (Groupe 3 + 7)	33206	Foliaire	L	3	0,4 L/acre (1,0 L/ha)	Aucun	7 à 14	12 heures	14	Brûlure hâtive, taches brunes	Moississure grise, moississure blanche	Afin d'optimiser la gestion de la résistance, compter les applications sur les plantons et dans le sol de fongicides du Groupe 7 dans le total des applica-tions foliaires recommandées du Groupe 7.
	 Quadris® Top (Groupe 3 + 11)	30518	Foliaire	L	3	0,23 à 0,4 L/acre (0,57 à 1 L/ha)	Aucun	7 à 14	12 heures	14	Brûlure hâtive	Taches brunes, dartrose, moississure blanche	La dose d'application diffère selon la cible.
Mildiou	 Orondis® Ultra (Groupe 40 + 49)	32805	Foliaire	L	4	0,16 à 0,24 L/acre (0,4 à 0,6 L/ha)	Aucun	7 à 14	12 heures	14	Mildiou		
	 Revus® (Groupe 40)	29074	Foliaire	L	4	0,16 à 0,24 L/acre (0,4 à 0,6 L/ha)	Agent tensioactif non ionique 0,25 % v/v*	7 à 10	12 heures	14	Mildiou		Pour une meilleure gestion de la résistance, appliquer avec un fongicide ne faisant pas partie du Groupe 40 et efficace contre le mildiou.
	 Ridomil® Gold ^{480 SL} (Groupe 4)	28474	Foliaire	S	3	84 mL/acre (0,21 L/ha)	Aucun	14	12 heures	14	Mildiou	Pourriture rose, pourriture aqueuse	Certaines souches de mildiou sont plus ou moins sensibles à Ridomil Gold. Appliquer avec un fongicide ne faisant pas partie du Groupe 4 et efficace contre le mildiou.
Large spectre	 Allegro® (Groupe 29)	27517	Foliaire	L	6 (dose élevée) 10 (dose faible)	0,16 à 0,24 L/acre (0,4 à 0,6 L/ha)	Aucun	7 à 10	24 heures	14	Mildiou, moississure blanche		La dose d'application diffère selon la cible.
	 Bravo®ZN (Groupe M)	28900	Foliaire	L	3	0,49 à 0,97 L/acre (1,2 à 2,4 L/ha)	Aucun	7 à 10	Voir les commentaires	2	Brûlure hâtive, mildiou, moississure grise		DS: 23 jours pour l'irrigation à la main, 19 jours pour l'épuration dans les pommes de terre de semence, 3 jours pour le dépistage, 12 heures pour toutes les autres activités
Postrécolte	 Stadium® (Groupes 3 + 11 + 12)	31050	Postrécolte	L	1	32,5 mL/1000 kg	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Pourriture sèche fusarienne	Gale argentée	
Large spectre	Insecticide												
	 Minecto® Pro (Group 6 + 28)	33023	Foliaire	L	2	0,15 à 0,27 L/acre (0,37 à 0,67 L/ha)	Agent tensioactif non ionique 0,1 à 0,5 % v/v	7	12 heures	14	Doryphore de la pomme de terre, pyrale du maïs, tétranyques, psylles de la pomme de terre, altises		La dose d'application diffère selon la cible. Ne pas utiliser Minecto® Pro si un insecticide du Groupe 28 a été appliqué dans le sillon ou sur la semence.
	Herbicides												
Graminées et feuilles larges	 Boundary® LQD (Groupes 5 + 15)	30812	Prélevée	E	1	0,75 à 1,01 L/acre (1,85 à 2,5 L/ha)	Aucun	S.O.	12 heures	60	Échinochloa pied-de-coq, digitaires (astringente, sanguine), panic capillaire, panic d'automne, sétaires (verte, glauque, géante), morelles (d'Amérique, noire de l'est), amarante rugueuse	Amarante à racine rouge	Ne pas utiliser sur les variétés Belleisle, Tobique ou Superior.
	 Dual II Magnum® (Groupe 15)	25729	Présemis incorporé ou en prélevée	E	1	0,51 à 0,71 L/acre (1,25 à 1,75 L/ha)	Aucun	S.O.	12 heures	S.O.	Morelles (d'Amérique, noire de l'est), digitaires (astringente, sanguine), échinochloa pied-de-coq, panic d'automne, sétaires (verte, glauque, géante), panic capillaire, souchet comestible (présemis incorporé seulement)	Amarante à racine rouge	Ne pas utiliser sur les variétés Belleisle, Tobique ou Superior.
Graminées	 Venture® L (Groupe 1)	21209	Postlevée	E	1	0,24 à 0,81 L/acre (0,6 à 2 L/ha)	Aucun	S.O.	12 heures	45	Mais spontané, sorgho d'Alep, ivraie de Perse, échinochloa pied-de-coq, blé de printemps et orge de printemps spontanés, folle avoine, panic millet sauvage, digitaire, panic d'automne, panic capillaire, sétaires (verte, glauque, géante), chiendent, muhlenbergie feuillée		La dose d'application diffère selon la cible.
Défanant	 Reglone® (Groupe 22)	26396	Défanant	S	2	0,51 à 1,42 L/acre (1,25 à 3,5 L/ha)	Aucun	4 à 6	24 heures	1	Tissus végétaux encore verts		La dose à employer dépend de la quantité de fanes et de mauvaises herbes présentes et de l'emplacement géographique.