


Regroupement	Produit (Groupe)	Homologation n°	Culture (Groupe de cultures)	Mode d'application	Type de préparation	Ordre de mélange	Nbre maximal d'application*	Dose d'application*	Adjuvant	Intervalle (jours)	DS (heures)	DAAR (jours)	Suppression de	Répression de	Commentaires
<b>Bio-solutions</b>															
Biostimulant	<b>MECAFOL</b>	2016013D	Toutes	Foliaire	L	S	S.O.	1,0 L/acre (2,5 L/ha)	Aucun	10 à 15	0	0			Aide les plantes à répondre aux stress abiotiques imprévus, notamment les dommages physiques, la chaleur, les basses températures et la sécheresse. En cas de dommage physique, appliquer dès que possible par la suite.
<b>Fongicides</b>															
Taches sur les feuilles et les fruits	<b>Allegro</b> (Groupe 29)	27517	Pommes	Foliaire	SC	L	5	0,2 à 0,4 L/acre (0,5 à 1,0 L/ha)	Aucun	7 à 14	24	28	Tavelure du pommier, moucheture du pommier, tache de suie du pommier, rouille de Virginie (rouille grillagée), pourriture amère, alternariose	Pourriture noire, tache phoméenne, rouille du cognassier, acarien jaune (tétranyque à deux points), tétranyque (acarien) rouge du pommier, ériophyde du pommier	La dose d'application diffère selon la cible.
	<b>Aprovia</b> (Groupe 7)	31981	Pommes et poires (11-09)	Foliaire	EC	E	4	0,12 à 0,2 L/acre (0,3 à 0,5 L/ha)	Aucun	7 à 10	12	30		Tavelure, oïdium, tache alternarienne	
	<b>Aprovia Top</b> (Groupes 3 + 7)	31526	Pommes et poires (11-09)	Foliaire	EC	E	4	0,16 à 0,26 L/acre (0,39 à 0,64 L/ha)	Aucun	7 à 10	12	30	Tavelure du pommier, oïdium (blanc), tache alternarienne, rouille de Virginie (rouille grillagée), rouille du cognassier, tache phoméenne, tache de suie, moucheture du pommier		La dose d'application diffère selon la cible.
	<b>InspireSuper</b> (Group 3 + 9)	30827	Pommes et poires (11-09)	Foliaire	EW	E	4	0,23 à 0,34 L/acre (0,56 à 0,84 L/ha)	Surfactant non ionique 0,1 % v/v	7 à 10	12	14	Tavelure du pommier, tache phoméenne, rouille de Virginie (rouille grillagée), moucheture du pommier, rouille du cognassier, tache de suie	Oïdium	La dose d'application diffère selon la cible.
Postrécolte	<b>Scholar</b> (Groupe 12)	29528	Pommes et poires (11-09)	Post-récolte	SC	L	1	496 mL/200 000 livre de fruits (496 mL/90 000 kg de fruits)	Aucun	S.O.	S.O.	S.O.	Moisissure bleue, pourriture grise		
	<b>RidomilGold</b> (Groupe 4)	28474	Pommes	Au sol	SL	S	2	1 mL/5 L d'eau/arbre	Aucun	S.O.	12	S.O.	Pourriture du collet		Pour utilisation seulement sur les arbres non en production.

DS = Délai de sécurité    DAAR = Délai d'attente avant la récolte    S.O. = Sans objet

### Moment approprié pour l'application

🌱	🌱	🌱	🌸	🌿	🍏	
Débourrement (pointe verte)	Bouton vert	Bouton rose	Floraison	Chute des pétales	Pulvérisations d'été	Postrécolte
<b>InspireSuper</b>						
<b>Aprovia / Aprovia Top</b>						
<b>Allegro</b>						
						<b>Scholar</b>
<b>MECAFOL</b>						
<b>Agri-Mek SC</b>						
<b>Minecto Pro</b>						
<b>Matador</b>						
<b>Dual II Magnum</b>						
<b>Venture L</b>						

## Tirez fierté de vos produits



Accédez à des informations sur la protection des cultures afin de produire les récoltes les plus commercialisables.



# Tirez fierté de vos produits



Accédez à des informations sur la protection des cultures afin de produire les récoltes les plus commercialisables.



Regroupement	Produit (Groupe)	Homologation n°	Culture (Groupe de cultures)	Mode d'application	Type de préparation	Ordre de mélange	Nbre maximal d'application*	Dose d'application*	Adjuvant	Intervalle (jours)	DS (heures)	DAAR (jours)	Suppression de	Commentaires
<b>Insecticides</b>														
Acarifens	 <b>Agri-Mek® SC</b> (Groupe 6)	31607	Pommes	Foliaire	SC	L	1	4,5 mL/100 L d'eau 68 mL/acre (0,17 L/ha)	Huile de pulvérisation 0,25 à 1 % v/v 10 à 20 L/ha	S.O.	12	28	Tétranyque à deux points, tétranyque de McDaniel, tétranyque rouge du pommier, mineuse marbrée du pommier	Précautions pour les pollinisateurs : Ce produit est toxique pour les abeilles. Ne pas appliquer pendant la période de floraison de la culture (du début de la floraison jusqu'à la fin de la chute des pétales).
			Poires	Foliaire	SC	L	2	4,5 à 9 mL/100 L d'eau 69 à 138 mL/acre (0,17 à 0,34 L/ha)	Huile de pulvérisation 0,25 à 1 % v/v 10 à 20 L/ha	21	12	28	Tétranyque à deux points, tétranyque de McDaniel, tétranyque rouge du pommier, ériophyide du poirier, tétranyque jaune, psylle du poirier	Précautions pour les pollinisateurs : Ce produit est toxique pour les abeilles. Ne pas appliquer pendant la période de floraison de la culture (du début de la floraison jusqu'à la fin de la chute des pétales).
Large spectre	 <b>Minecto® Pro</b> (Groupes 6 + 28)	33023	Pommes	Foliaire	SC	L	1	0,2 L/acre (0,5 L/ha)	Huile de pulvérisation 0,25 à 1 % v/v 10 à 20 L/ha OU SNI 0,1 à 0,5 % v/v	S.O.	12	28	Carpocapse, tordeuse orientale du pêcher, mineuse marbrée, mineuse marbrée occidentale, tordeuse à bandes obliques, enrouleuse trilignée, tordeuse du pommier, tordeuse européenne, pique-bouton du pommier, tordeuse du bouton du pommier, hoplocampe des pommes, tétranyque à deux points, tétranyque de McDaniel, tétranyque rouge du pommier	Si on le mélange avec un agent tensioactif non ionique, utiliser un type pénétrant. Ce produit est toxique pour les abeilles. Ne pas appliquer pendant la période de floraison de la culture (du début de la floraison jusqu'à la fin de la chute des pétales).
			Poires	Foliaire	SC	L	1 or 2	0,2 à 0,4 L/acre (0,5 à 1 L/ha)	Huile de pulvérisation 0,25 à 1 % v/v 10 à 20 L/ha OU SNI 0,1 à 0,5 % v/v	10 ou 21	12	28	Carpocapse, tordeuse orientale du pêcher, mineuse marbrée, mineuse marbrée occidentale, tordeuse à bandes obliques, enrouleuse trilignée, tordeuse du pommier, tordeuse européenne, pique-bouton du pommier, tordeuse du bouton du pommier, hoplocampe des pommes, tétranyque à deux points, tétranyque de McDaniel, tétranyque rouge du pommier	La dose d'application diffère selon la cible; l'intervalle entre les pulvérisations dépend de la cible. Si on le mélange avec un agent tensioactif non ionique, utiliser un type pénétrant. Ce produit est toxique pour les abeilles. Ne pas appliquer pendant la période de floraison de la culture (du début de la floraison jusqu'à la fin de la chute des pétales).
			Pommes	Foliaire	EC	E	3	34 à 42 mL/acre (83 à 104 mL/ha)	Aucun	7	12	7	Puceron vert du pommier, punaise brune du pommier, cécidomyie du pommier, carpocapse de la pomme, tordeuse du pommier, tordeuse à bandes obliques, tordeuse pâle du pommier, mineuse marbrée du pommier, cicadelle blanche du pommier, arpenreuse tardive, charançon de la prune, punaise terne, puceron lanigère du pommier	La dose d'application diffère selon la cible. Appliquer tôt le matin, avant que la température ne grimpe, ou le soir, après que la chaleur du jour est passée.
	 <b>Matador®</b> (Groupw 3)	24984	Poires	Foliaire	EC	E	1	34 mL/acre (83 mL/ha)	Aucun	S.O.	12	7	Psylle du poirier, carpocapse de la pomme	Appliquer tôt le matin, avant que la température ne grimpe, ou le soir, après que la chaleur du jour soit passée.
<b>Herbicides</b>														
Graminées et feuilles larges	 <b>Dual II Magnum®</b> (Groupe 15)	25729	Pommes et poires	Présemis incorporé ou en prélevée	EC	E	1	0,51 à 0,71 L/acre (1,25 à 1,75 L/ha)	Aucun	S.O.	12	S.O.	Feuilles larges et graminées annuelles, souchet comestible	
Graminées	 <b>Venture L®</b> (Groupe 1)	21209	Pommes et poires	Postlevée ou en bandes	EC	E	1	0,24 à 0,81 L/acre (0,6 à 2 L/ha)	Aucun	S.O.	12	S.O.	Graminées annuelles	La dose d'application diffère selon la cible.

\* Pour des renseignements complets à propos des doses, consulter l'étiquette du produit. Les informations sur les doses sont basées sur les étiquettes des produits. Si l'étiquette d'un produit contient des fourchettes de doses, alors le présent guide de référence rapide énumérera soit : (i) la fourchette de doses complète; (ii) la fourchette de doses la plus courante; ou (iii) la dose la plus couramment utilisée. Avant l'application, toujours consulter l'étiquette afin de confirmer les renseignements sur l'homologation pour la culture/le groupe de cultures et sur l'application, ainsi que sur les zones tampons, l'EPI, etc.

Tous les renseignements sont à jour au moment de la publication et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pour plus d'information, communiquez avec notre Centre d'interaction avec la clientèle au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682) ou visitez Syngenta.ca.

Toujours lire l'étiquette et s'y conformer. Agri-Mek®, Aprovia®, Dual II Magnum®, Inspire Super®, Matador®, Minecto®, Ridomil Gold®, Scholar®, Venture® et le logotype Syngenta sont des marques de commerce d'une société du groupe Syngenta. Allegro® is a trademark of ISK Biosciences Corporation. Megafo® est une marque déposée de VALAGRO S.p.A., société du groupe Syngenta. © 2024 Syngenta 240918